Retrosternal Guatr

Retrosternal Goiter

Guatr / Goiter

M.Muharrem Erol
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Bursa, Türkiye

Editör için:

Öncelikle yazarlara bu geniş retrosternal guatr yazısını [1] bizimle paylaştıkları için teşekkürler.Göğüs cerrahisi rutininde oldukça sık karşılaştığımız bu multidispiliner durumu tartışarak güncel yaklaşımları bize sundular. Merak ettiğim birkaç konuda yazarların fikirlerini almak istiyorum.

Reoperasyon uygulanan hastalara hangi insizyonlar uygulandı. Bunlardan malign tanı alan var mıydı? Rezeksiyon sonrası malign tanı alan hastalar göz önüne alınırsa, yazarlar şüpheli olgularda pre-op PET-CT çektirmeyi önerirler mi? [2]

İkincisi; bu olgular cerrahi uygulama açısından multidisiplener yaklaşım gerektiren olgular. Bu konuda nasıl davranıldı. Hangi disiplinlerle çalışıldı. Kaç olguya per-op dahil olundu? Kaçı önceden planlandı? Son merak ettiğim konu; sternotomi sayıları; kaç olguya parsiyel, kaç olguya total olarak sternotomi uygulandı?

Kaynaklar

1. Yazıcıoğlu A, Bıçakçıoğlu P, Yekeler E, Kaya S, Karaoğlanoğlu N. Retrosternal goiter: analysis of 42 cases. J Clin Anal Med 2013;4(5):400-3.
2. Hong CM, Ahn BC, Jeong SY, Lee SW, Lee J. Distant metastatic lesions in patients with differentiated thyroid carcinoma. Clinical implications of radioiodine and FDG uptake. Nuklearmedizin 2013;52(4):121-9.

DOI: 10.4328/JCAM.2069 Received: 27.09.2013 Accepted: 01.10.2013 Printed: 01.05.2015
Corresponding Author: M.Muharrem Erol, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Bursa. Türkiye. T.: +90 2242952341 E-Mail:muharremerol@hotmail.com